

Jasminum Magentæ Guillaum. *Bull. Mus.*, 2^e sér., II, p. 169 (nomen).

Frutex ramis flexuosis, tenuiter puberulis, folia unifoliolata, lamina ovalo-triangulari (3-5 cm. × 2,5-3,5 cm.), apice obtuso, basi rotundato-truncato, rigido, glabro, petiolo 1-1,5 cm. longo, tenuiter puberulo, basin versus articulato. Inflorescentiæ salis densæ, axillares, corymbosæ, puberulæ, bracteæ subulatæ vel inferiores foliaceæ, pedicelli filiformes, usque ad 1 cm. longi, sparse puberuli, calyx campanulatus, dentibus foliaceis triangularibus, aculis, lubo æquilongis vel leviter longioribus, corolla 3 cm. longa, tubo cylindrico, apicem versus vix dilatato, lobis 4, triangularibus, acutis, lubo 3-plo brevioribus, stamina apicem tubi attingentia vel sub-attingentia, subsessilia, antheris ovalis, apiculatis, ovarium obovoideum, stylo glabro, lubi medium haud allingente, stigmale subulato, apice bifido.

Magenta (574, 578).

Voisin de *J. neo-caledonicum* Schltr., en diffère par les rameaux finement pubérulents, les inflorescences ± velues, les lobes du calice triangulaires et foliacés, non subulés.

LVIII. — PLANTES RECUEILLIES PAR GODEFROY.

M. C. d'Alleizette, autrefois attaché au Service de Culture du Muséum, actuellement capitaine d'administration, a bien voulu me communiquer, pour détermination, une petite collection recueillie à son intention en 1910-1911, en Nouvelle-Calédonie, par Godefroy, soldat d'infanterie coloniale, mort pour la France à Charleroi.

En voici la liste :

- Oceanopapaver neo-caledonicum* Guillaum. — Presqu'île Ducos.
- Hybanthus austro-caledonicus* Schinz et Guillaum. — La Coulée.
- Ptilosporum Deplanchei* Brong. et Gris. — Dumbéa.
- P. dzumacense* Guillaum. — Païta.
- P. Pancheri* Brong. et Gris. — Dumbéa?
- P. pronyense* Guillaum. — Prony.
- P. Simsonii* Montr. — M^t Mou, Prony?
- Garcinia Hennecarllii* Pierre — Prony.
- G. Pancheri* Pierre — Prony.
- Heritiera littoralis* Ait. — M^t Dore.
- Maxwellia lepidota* Baill. — Le long de la côte vers Dumbéa.
- Solmsia calophylla* Baill. var. *chrysophylla* Guillaum. — Dumbéa.
- Melochia odorata* L. — Prony.
- Elæocarpus alaternoides* Brong. et Gris. — M^t Mou, Dumbéa.
- E. rotundifolius* Brong. et Gris. — Prony.
- E. sp.* — Prony.

E. sp. cf. E. oreogena Schltr. — M^t Koghi.

Hugonia Penicillanthemum Baill. ex Brong. et Gris. — Dumbéa.

Boronella Pancheri Baill. — Prony.

Myrtopsis Novæ-Caledoniæ Engl. — Nouméa.

Evodia triphylla DC. — Prony.

Comptonella albiflora Bak. f. — M^t Koghi.

Dutailleya sessilifoliola Guillaum. — Yahoué.

Acronychia lævis Forst. — M^t Koghi.

Bauerella australiana Borzi. — Sans localité, Prony.

Phelline comosa Labill. — Prony.

Picrocardia resinosa Radlk. — Région de Prony.

Inflorescentiæ racemosæ, 2,5 cm. longæ, rufo velutinæ, bracteis subulatis minimis, pedicello brevissimo, sparse breviter piloso glandulosoque, sepalis 5, auguste deltoideis 1 mm longis axilla glandulosa, petalis deltoideis, fere 3-plo brevioribus, axilla glandulosa, staminodiis 10, sepalis leviter brevioribus, filamentis petalis æquilongis, antheris capitatis, disco tumide pulvinari, petalis æquialto, margine undulato, extra foveolato, ovario late obcordato, valde compresso, 2 loculari, 2 mm longo, margine appresse rufo piloso, marginibus glabris, obtuse incrassatis, stigmatibus punctiformibus lateralibus.

Le genre n'était connu que par un échantillon en fleur ♂ et 2 autres en fruit.

Dysoxylum Balansæ C. DC. — Prony.

Carapa obovata Bl. — Pouéta.

Ilex Sebertii Panch. et Seb. — M^t Koghi, Prony?

Pterocelastrus marginatus Baill. — Dumbéa.

Salacia neo-caledonica Loes. — M^t Mou.

Podonophelium Homei Radlk. — Yahoué.

Guioa glauca Radlk. — M^t Koghi, sans localité.

Cupaniopsis chytradenia, Radlk. — Dumbéa.

C. fruticosa Radlk. — Prony.

C. trigonocarpa Radlk. — Prony.

Storthocalyx chryseus Radlk. — Prony.

Elatostachys apetala Radlk. — Nouméa, M^t Mou.

Euroshinus verrucosus Engl. M^t Dzumac. — Les folioles ne dépassent pas 4 paires mais il semble bien cependant que cet échantillon doit être rapporté à cette espèce.

E. sp. Prony.

Peut-être espèce nouvelle à folioles très obtuses, au nombre de 4 paires, se rapprochant beaucoup de celles d'*E. obtusifolius* Engl. mais les panicules, complètement glabres, naissent sur le tronc et non à l'extrémité des rameaux; les fleurs rougeâtres sont uniquement ♂.

Semecarpus neo-caledonicus Engl. — Nouméa.

Santaloides Balansæana Schellenb. — Prony.

- Tephrosia purpurea* Pers. — Nouméa.
Desmodium pentaphyllum Harms. — M^t Mou.
D. umbellatum DC. — M^t Mou.
Arthroclianthus Deplanchei Hochr. — M^t Dzumac.
A. sanguineus Baill. — M^t Mou.
Glycine tabacina Benth. — Nouméa.
Sophora tomentosa L. — Prony.
Albizzia oboata Benth. — Dumbéa.
A. tenuispica Harms. — Nouméa.
Licania Balansæ Guillaum. — Païta.
Dedeia major. Baill. — M^t Mou.
D. resinosa Schltr. — M^t Mou.
Spiræanthemum austro-caledonicum Brong. et Gris. — M^t Mou.
S. pedunculatum Schltr. — Prony.
Cunonia atrorubens Schltr. — Baie de Boulari.
C. Balansæ Brong. et Gris. — Dumbéa.
C. pterophylla Schltr. — Prony.
Terminalia Catappa L. — Prony.
Bæckeia pinifolia DC. — Prony.
B. virgata Andr. — M^t Mou.
Callistemon suberosum Panch. ex Brong. et Gris. — M^t Koghi.
Melaleuca gnidioides Brong. et Gris. — Prony.
Tristania capitulata Panch. ex Brong. et Gris. — Prony.
T. glauca Panch. ex Brong. et Gris. — Prony, Baie de Boulari.
T. Guillainii Heck. — Prony.
Moorea artensis Montr. — Yahoué, Païta.
M. Deplanchei Guillaum. — Prony.
Calycorectes rubiginosus Guillaum. — Prony.
Metrosideros dolichandra Schltr. — Prony.
M. Engleriana Schltr. — M^t Dzumac.
M. nitida Brong. et Gris? — M^t Mou.
M. porphyrea Schltr. — M^t Koghi.
Xanthostemon aurantiacum Heck.
X. Beauvisagei Pampan. — Prony.
X. multiflorum Beauvis. — Baie de Boulari.
Rhodomyrtus andromedoides. Brong. et Gris. — Prony.
Psidiomyrtus locellatus Guillaum. — Sans localité.
Myrtus rufo-punctatus Panch. ex Brong. et Gris — M^t Mou,
Païta.
M. supra-axillaris Guillaum. — M^t Mou.
M. turbinatus Sehltr. — Païta.
Eugenia Gacognei Montr. — Prony.
E. horizontalis Panch. ex Brong. et Gris. — M^t Mou.
E. stricta Panch. ex Brong. et Gris. — Païta.
Caryophyllus densiflorus Vieill. mss. — Prony.

Syzygium multipetalum Panch. ex Brong. et Gris. — Baie de Kouétoukouéta.

S. patens Panch. ex Brong. et Gris. — Dumbéa.

S. sp. nov.? — Prony (identique à un échantillon aussi incomplet recueilli par M. et M^{me} Le Rat).

S. wagapense Brong. et Gris. — Nouméa.

Pemphis acidula Forst. — Baie de Boulari.

Sonneratia alba Sm. — Baie de Boulari.

Casearia Melistaurum Spreng. — Bouraké.

Homalium kanalense Briq. — M^t Mou.

H. Le Ratorum Guillaum. — M^t Koghi.

Eremopanax angustata Baill. — M^t Koghi.

E. grandifolia Guillaum. — Yahoué.

Tieghemopanax dioicus R. Vig. — Prony.

Dizygotheca Reginæ Hemsl. — Prony.

Alangium Bussyanum Harms. — Prony.

Morierina montana Vieill. — Dumbéa.

Chomelia microcarpa Guillaum. — Prony, Dumbéa.

Ixora Francii Schltr. — Dumbéa.

I. aff. I. longiloba Guillaum., mais inflorescences et fruits complètement glabres et feuilles plus épaisses. — M^t Mou.

I. yahouensis Schltr. — M^t Koghi.

Atractocarpus platyxyton Guillaum. — Nouméa.

Guettarda platycarpa Guillaum. — Dumbéa.

G. splendens Baill. — Sans localité.

Morinda Candollei Beauvis. var. *sub villosa* Guillaum. — Prony.

Cælospermum corymbosum Baill. — M^t Mou.

Psychotria Baillonii Schltr. — Nouméa.

P. cardiochlamys Schltr. — Nouméa.

P. collina Labill. — Yahoué, Baie de Boulari.

P. Faquetii Schltr. — M^t Mou.

P. Le Ralii Guillaum. — M^t Koghi.

P. monanthos Schltr. — Prony.

P. rubefacta Guillaum. — M^t Mou.

P. rupicola Schltr. — Prony, Dumbéa.

P. semperflorens Panch.? — Prony.

P. speciosa S. Moore. — Sans localité.

Normandia neo-caledonica Hook. f. — M^t Mou.

Scævola Beckii Zahlbr. var. *sericea* Guillaum. — Baie de Boulari.

S. saligna Forst. f. — Prony.

Leucopogon longistylis Brong. et Gris. — Prony.

Cyathopsis floribunda Brong. et Gris. — Prony.

Tapeinosperma deflexum Mez. — Yahoué.

Planchonella Baillonii Dub. — Prony.

P. Baueri Dub. — Cap N'dua.

- P. crebrifolia* Pierre — M^t Mou.
La partie supérieure des rameaux présente des fasciations atteignant 3,5 cm. de largeur.
- P. Wakere* Pierre? — Dumbéa.
Symplocos defoliata Brand. — M^t Koghi.
S. flavescens Brand. — Nouméa, Dumbéa.
S. lorluosa Vieill. ex Guillaum. — Sans localité.
Notalea Badula Vieill. — Dumbéa.
Jasminum didymum Forst. var. — M^t Koghi.
J. pulchrefoliatum Guillaum. — Prony.
Melodinus Balansæ Baill. — Prony.
M. scandens Forst. — M^t Mou.
Rauwolfia semperflorens Schltr. — Baie de Boulari.
Alyxia disphærocarpa v. Heurck et Müll.-Arg. — Nouméa.
Alsonia filipes Schltr. — Baie de Boulari.
A. lanceolata v. Heurck et Müll.-Arg. — Païta.
A. Legouixiæ v. Heurck et Müll.-Arg. — M^t Dzumac, Dumbéa.
A. Lenormandii v. Heurck et Müll.-Arg. — Prony.
Parsonsia glaucescens Baill. — Dumbéa.
Geniosloma densiflorum Baill. — Prony.
G. oleifolium S. Moore — Prony.
G. Pancheri Baill. — Prony, Païta.
G. veslitum Baill. var. *dombeense* Guillaum. — Païta.
Coronanthera pedunculosa C. B. Clarke var. *stellata* C. B. Clarke.
— Prony.
C. sericea C. B. Clarke. — M^t Koghi.
Pseuderanthemum Complonii S. Moore. — Nouméa, Prony.
Gmelina neo-caledonica S. Moore. — Prony.
Vilx trifolia L. — Nouméa.
Oxera palmalinervia Dub. — Prony.
O. pulchella Labill. var. *grandiflora* Dub. — Nouméa.
Calpidia giganlocarpa Heimerl. — Prony.
Deeringia allissima F. Muell. — Dumbéa.
Ascarina rubricaulis Solms. — Dumbéa.
Litsea triflora Guillaum. — Païta.
Beauprea elegans Brong. et Gris. — Prony.
Garnieria spathulæfolia Brong. et Gris. — Prony.
Wickstroemia indica C. A. Mey.? — Prony.
Elythranthe tenuifolia Engl. — M^t Mou.
Apodella scandens v. Tiegh. — Prony.
Glochidion Billardieri Baill. — Nouméa.
G. wagapense Müll.-Arg. — Dumbéa.
Longetia buxoides Baill. — Yaté.
L. depauperata Baill. — St. Vincent.
Bureavia carunculata Baill. — M^t Mou.